

Lumpy Skin Disease (LSD)

ERREGER

- Lumpy Skin Disease Virus (Pockenviren)

EMPFÄNGLICHE TIERARTEN



Rinder

ÜBERTRAGUNG

Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch blutsaugende Insekten. Die Viren können auch durch Kontakt mit Hautknoten, durch Speichel, Sekrete und Milch infizierter Tiere, kontaminiertes Werkzeug und Samen übertragen werden.

SYMPTOME

Fieber, knotige Hautveränderungen am Kopf, Hals, Rücken und Euter, Lymphknotenschwellung, Nasen- und Augenausfluss, Schwäche, Milchleistungsrückgang, Aborte

MASSNAHMEN

Sperrung, Keulung der empfänglichen Tiere, Reinigung und Desinfektion

WIE SCHÜTZEN?

- Biosicherheitsmaßnahmen
- Impfung (behördlich angeordnet)
- Schutz vor Insekten (Repellentien)

AUSWIRKUNGEN

Tierleid durch schwere klinische Krankheitsverläufe, wirtschaftliche Auswirkungen durch Handelsbeschränkungen, Exportverbote und Bekämpfungskosten

BEI VERDACHT

Meldepflicht, jeder Verdacht ist dem Amtstierarzt / der Amtstierärztin zu melden

Weiterführende Informationen:



Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

WIR leben Land
Gemeinsame Agrarpolitik Österreich



Kofinanziert von der Europäischen Union